

M/S : médecine sciences



Vers un usage thérapeutique de ligands sélectifs du récepteur cannabinoïde 2 dans l'athérosclérose

Toward a therapeutic use of cannabinoid CB(2) receptor in atherosclerosis

Sabine Steffens and François Mach

Volume 22, Number 1, janvier 2006

URI: <https://id.erudit.org/iderudit/012219ar>

[See table of contents](#)

Publisher(s)

SRMS: Société de la revue médecine/sciences
Éditions EDK

ISSN

0767-0974 (print)
1958-5381 (digital)

[Explore this journal](#)

Cite this article

Steffens, S. & Mach, F. (2006). Vers un usage thérapeutique de ligands sélectifs du récepteur cannabinoïde 2 dans l'athérosclérose. *M/S : médecine sciences*, 22(1), 7–9.

Tous droits réservés © M/S : médecine sciences, 2006

This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online.

<https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/>

érudit

This article is disseminated and preserved by Érudit.

Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research.

<https://www.erudit.org/en/>

Vers un usage thérapeutique de ligands sélectifs du récepteur cannabinoïde 2 dans l'athérosclérose

Sabine Steffens, François Mach

> L'athérosclérose - affection inflammatoire - reste la première cause de maladie coronarienne et d'accident vasculaire cérébral et rend compte de près de 50 % des décès dans les pays occidentaux. L'identification de nouveaux traitements contre la maladie athéromateuse revêt par conséquent un très grand intérêt et constitue un défi permanent pour la communauté médicale. Les cannabinoïdes, tels que le Δ^9 -tétrahydrocannabinol (THC), le principal composant psycho-actif de la marijuana, régule certaines fonctions de l'immunité et pourrait donc s'avérer bénéfique sur le plan thérapeutique dans le traitement des maladies inflammatoires. Nous avons montré récemment que l'administration orale de faibles doses de THC inhibe la progression de l'athérosclérose chez la souris au travers d'une action immunomodulatrice pléiotrope sur les cellules inflammatoires. Tous ces effets étaient modulés par le récepteur cannabinoïde CB2, le principal récepteur cannabinoïde exprimé sur les cellules immunitaires. Les espoirs suscités par ces résultats, pour prometteurs qu'ils soient, sont cependant tempérés par les risques bien connus associés à la consommation de marijuana puisque le THC possède une affinité pour les deux récepteurs cannabinoïdes CB1 et CB2, qu'il active de manière similaire. Autrement dit, l'un des défis pour la recherche sur le cannabinoïde consiste en l'identification et la caractérisation de dérivés du cannabinoïde capables de stimuler sélectivement le récepteur CB2.

La découverte des récepteurs membranaires se liant au composé psychoactif de la marijuana, le Δ^9 -tétrahydrocannabinol, et de leurs ligands endogènes a conduit à la description du système endocannabinoïde. Actuellement, ce système est formé de deux récepteurs qui ont pu être clonés [1, 2], ainsi que de ligands endogènes ou endocannabinoïdes, notamment l'anandamide, le 2-arachidonoylglycérol et quelques autres [3-5]. Tous les endocannabinoïdes identifiés à ce jour sont des dérivés d'acides gras polyinsaturés à longue chaîne latérale et présentent des profils de sélectivité variables pour les deux récepteurs cannabinoïdes [6].

Le système endocannabinoïde

Les deux récepteurs cannabinoïdes sont couplés à la protéine G et modulent des messagers secondaires et des substances de signalisation, tels que l'adénylate cyclase [7], les protéine kinases activées par les mitogènes [8] et certains membres de la famille des NF- κ B [9, 10]. La distribution de ces deux récepteurs dans les différents tissus explique le tableau des effets psychotropes et périphériques bien connus du THC. Le récepteur cannabinoïde 1 (CB1) est essentiellement exprimé au niveau du système nerveux central et périphérique, tandis que le récepteur cannabinoïde 2 (CB2) se trouve pratiquement exclusivement sur les cellules immunitaires [11]. Le récepteur CB2 n'a aucun effet neurologique connu, mais il pourrait jouer un rôle physiologique dans la réponse

Division de Cardiologie,
Département de Médecine,
Centre hospitalier universitaire,
Fondation pour la Recherche Médicale,
64, avenue Roseraie, 1211 Genève, Suisse.
Francois.Mach@medecine.unige.ch

immunitaire, l'inflammation et la douleur chronique [12].

Effets du THC sur l'athérosclérose

Le développement d'agonistes et d'antagonistes sélectifs, ainsi que de souches de souris dépourvues de récepteurs CB1 et CB2, a grandement contribué à améliorer notre compréhension de la biologie des cannabinoïdes. La capacité de régulation de la fonction immunitaire des cannabinoïdes est maintenant bien établie. Le traitement *in vitro* par le THC de cellules immunitaires humaines inhibe la sécrétion de cytokines et de chimio-kines pro-inflammatoires et induit une différenciation en phénotype Th2 [13, 14]. Le cannabidiol, une plante cannabinoïde non psychotrope, a des effets positifs sur l'inflammation chronique de l'arthrite murine induite par le collagène, un modèle d'arthrite rhumatoïde chez la souris, par inhibition de la prolifération lymphocytaire spécifique de l'antigène et de la sécrétion d'IFN α [15]. L'inhibition, induite par le THC, de l'activation des cellules T *helper* fait défaut chez les souris déficientes en CB2, ce qui renforce l'hypothèse selon laquelle les effets immunomodulateurs des cannabinoïdes dépendent du récepteur CB2 [16]. Le très grand nombre d'études ayant démontré les propriétés immunomodulatrices des cannabinoïdes nous a récemment incités à tester le potentiel anti-athéroscléroti-



que du THC dans un modèle murin [17]. Nous avons ainsi trouvé que le THC inhibe la progression des lésions athérosclérotiques établies. Cet effet est associé à une diminution de la prolifération cellulaire et de la sécrétion d'IFN α par les cellules lymphoïdes, ainsi qu'à une diminution de l'infiltrat de macrophages dans les lésions athérosclérotiques. Nous avons par ailleurs détecté la présence du récepteur CB2 au niveau des lésions athérosclérotiques chez l'homme et la souris. Nous avons également observé *in vitro* que le THC inhibe la réponse chimiotactique des macrophages en réponse au MCP-1 et diminue l'expression du récepteur CCR2 des chimiokines. Il faut souligner que ces effets étaient bloqués en présence d'un antagoniste spécifique du récepteur CB2 (SR144528) [18]. Il est également très intéressant de noter que les effets du THC observés *in vitro* et *in vivo* étaient dépendants de la dose. La courbe illustrant la relation dose-effets avait un aspect en U, les doses faibles et les doses élevées étant inactives. La dose efficace était plus basse que la dose habituellement associée aux effets psychotropes du THC. Il est cependant difficile d'extrapoler à l'homme les résultats obtenus dans le modèle d'athérosclérose chez la souris dépourvue d'apolipoprotéine E (*ApoE*^{-/-}). Nous avons trouvé des concentrations nanomolaires, donc extrêmement faibles, dans le sérum de souris traitées par le THC, ce qui pourrait s'expliquer par le stockage du THC dans le tissu graisseux, les cannabinoïdes étant connus pour être très lipophiles. Le modèle des souris hypercholestérolémiques *ApoE*^{-/-} est caractérisé par une forte accumulation de tissu graisseux, en particulier au niveau de la paroi vasculaire. Le THC pourrait donc être stocké dans les lésions athérosclérotiques avec des concentrations locales particulièrement élevées au niveau des sites inflammatoires. D'autres études seront nécessaires pour vérifier si une accumulation locale de THC contribue à l'action anti-athérosclérotique et si des concentrations similaires de THC pourraient être efficaces chez l'homme.

Quoi qu'il en soit, notre étude a montré que le THC exerce une action anti-inflammatoire en agissant sur le récepteur CB2 et qu'il diminue l'infiltrat de cellules immunitaires dans les lésions athérosclérotiques. À cette action favorable au plan thérapeutique s'opposent néanmoins les effets indésirables bien connus de la consommation de marijuana. Le THC se lie avec une affinité comparable aux deux récepteurs cannabinoïdes CB1 et CB2, qu'il stimule de manière similaire. Il a été démontré que le fait de fumer de la marijuana entraîne des effets sur les récepteurs CB1 du cerveau, qui induisent une augmentation de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle avec pour conséquence une augmentation du risque de maladie coronarienne [19].

Cannabinoïdes non psychotropes

Par ailleurs, si l'intérêt des cannabinoïdes en tant qu'agents thérapeutiques est aujourd'hui incontesté, leurs effets psychotropes ont jusqu'ici considérablement limité leur emploi dans la pratique clinique. C'est la raison pour laquelle tous les efforts de recherche se concentrent actuellement sur l'identification et le développement de substances cannabinoïdes synthétiques ou dérivées de plantes qui soient à la fois efficaces sur le plan thérapeutique et dépourvues d'effets psychotropes. Parmi les extraits de plantes non psychotropes, le cannabidiol, l'un des composants essentiels de la marijuana, s'est démarqué par une action thérapeutique anti-inflammatoire puissante, associée à des propriétés neuroprotectrices et à un effet antiarthritique chez la souris [13, 15]. Le nombre d'effets favorables observé a logiquement conduit à la réalisation de différents tests dans le cadre d'essais cliniques avec des extraits végétaux de THC/cannabidiol. Ces travaux ont montré que les médicaments étudiés étaient en général bien tolérés et qu'ils ne présentaient que peu d'effets indésirables. Il va sans dire que des études plus

vastes, sur des périodes d'observation plus longues, seront nécessaires pour confirmer l'amélioration cliniquement significative des symptômes neurologiques [20, 21].

Il est intéressant de constater que plusieurs cannabinoïdes synthétiques possédant une action anti-inflammatoire tout en étant non psychotropes ont été développés récemment à partir de cannabinoïdes d'origine végétale, notamment l'acide ajulémique (CT3) et le HU-320 [22-24]. Le développement d'agonistes ciblant sélectivement le récepteur CB2 revêt un intérêt tout particulier. Dans les études précliniques, au moins deux agonistes du récepteur CB2, le HU-308 et l'AM-1241, se sont avérés dépourvus d'effets centraux et sont donc prometteurs dans la perspective du traitement de la douleur aiguë et chronique [25-28]. Les propriétés anti-inflammatoires des agonistes du récepteur CB2 en font aussi des candidats idéaux soumis à des tests dans les troubles de l'immunité, tels que l'athérosclérose. On ne sait toutefois que peu de choses sur le mode d'action au niveau moléculaire de ces substances, et d'autres études seront encore nécessaires pour obtenir une meilleure compréhension sur ce plan. Tout récemment, il a été démontré *in vitro* et *in vivo* qu'un traitement chronique avec le dérivé cannabinoïde synthétique HU210, agissant sélectivement sur le récepteur CB1 des cellules cérébrales de l'hippocampe (noyau gris), augmente la prolifération et la différenciation de ces cellules (neurogenèse), et exerce un effet anxiolytique et antidépresseur [29]. Il est intéressant de relever que d'autres substances de type héroïne, cocaïne, ou même l'alcool, diminuent la multiplication de ces même cellules du noyau gris de l'hippocampe, ce qui pourrait être en relation avec l'effet de dépendance bien connu de ces substances. Ces résultats suggèrent que les dérivés du cannabis avec effet cérébral sur le récepteur CB1 (marijuana par exemple) possèdent des propriétés de type antidépresseur.



Conclusions

Il existe aujourd'hui un faisceau d'indices suggérant fortement l'existence d'un vaste champ d'applications possibles pour les cannabinoïdes dans toute une série d'affections. Malgré cela, les applications en médecine sont restées très limitées jusqu'ici, essentiellement en raison des effets psychotropes associés à la prise de marijuana. Maintenant que nous disposons de cannabinoïdes non psychoactifs, il devient absolument indispensable de se pencher de plus près sur les effets pharmacologiques et biologiques de ces médicaments, afin d'identifier les agents les plus puissants et les plus sélectifs dans l'optique d'une utilisation thérapeutique.

Perspectives d'avenir

Les propriétés régulatrices des cannabinoïdes dans certains processus de l'immunité sont aujourd'hui bien établies et suggèrent que ces principes actifs ont un potentiel thérapeutique remarquable dans toute une série de situations cliniques. Des données précliniques récentes ont notamment mis en lumière les effets anti-athérosclérotiques très intéressants des cannabinoïdes. De nouvelles stratégies fondées sur des cannabinoïdes non psychotropes, autrement dit sur des substances activant sélectivement le récepteur CB2, pourraient contribuer à la solution du problème des effets indésirables associés à l'administration orale des cannabinoïdes ou à leur inhalation par la fumée. Les agonistes sélectifs du récepteur CB2 sont des substances prometteuses dans la perspective du traitement contre l'athérosclérose sans les effets indésirables habituellement associés à la thérapie par les cannabinoïdes. ♦

Toward a therapeutic use of cannabinoid CB(2) receptor in atherosclerosis

RÉFÉRENCES

- Matsuda LA, Lolait SJ, Brownstein MJ, et al. Structure of a cannabinoid receptor and functional expression of the cloned cDNA. *Nature* 1990 ; 346 : 561-4.
- Munro S, Thomas KL, Abu-Shaar M. Molecular characterization of a peripheral receptor for cannabinoids. *Nature* 1993 ; 365 : 61-5.
- Devane WA, Hanus L, Breuer A, et al. Isolation and structure of a brain constituent that binds to the cannabinoid receptor. *Science* 1992 ; 258 : 1946-9.
- Mechoulam R, Ben-Shabat S, Hanus L, et al. Identification of an endogenous 2-monoglyceride, present in canine gut, that binds to cannabinoid receptors. *Biochem Pharmacol* 1995 ; 50 : 83-90.
- Sugiura T, Kondo S, Sukagawa A, et al. 2-Arachidonoylglycerol : a possible endogenous cannabinoid receptor ligand in brain. *Biochem Biophys Res Commun* 1995 ; 215 : 89-97.
- McAllister SD, Glass M. CB(1) and CB(2) receptor-mediated signalling : a focus on endocannabinoids. *Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids* 2002 ; 66 : 61-171.
- Howlett AC, Johnson MR, Melvin LS, Milne GM. Nonclassical cannabinoid analgesics inhibit adenylyl cyclase : development of a cannabinoid receptor model. *Mol Pharmacol* 1988 ; 33 : 297-302.
- Bouaboula M, Poinot-Chazel C, Marchand J, et al. Signaling pathway associated with stimulation of CB2 peripheral cannabinoid receptor. Involvement of both mitogen-activated protein kinase and induction of Krox-24 expression. *Eur J Biochem* 1996 ; 237 : 704-11.
- Daaka Y, Zhu W, Friedman H, Klein TW. Induction of interleukin-2 receptor alpha gene by delta9-tetrahydrocannabinol is mediated by nuclear factor kappaB and CB1 cannabinoid receptor. *DNA Cell Biol* 1997 ; 16 : 301-9.
- Jeon YJ, Yang KH, Pulaski JT, Kaminski NE. Attenuation of inducible nitric oxide synthase gene expression by delta 9-tetrahydrocannabinol is mediated through the inhibition of nuclear factor kappa B/Rel activation. *Mol Pharmacol* 1996 ; 50 : 334-41.
- Lutz B. Molecular biology of cannabinoid receptors. *Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids* 2002 ; 66 : 123-42.
- Klein TW, Newton C, Larsen K, et al. The cannabinoid system and immune modulation. *J Leukoc Biol* 2003 ; 74 : 486-96.
- Srivastava MD, Srivastava BI, Brouhard B. Delta9 tetrahydrocannabinol and cannabidiol alter cytokine production by human immune cells. *Immunopharmacology* 1998 ; 40 : 179-85.
- Yuan M, Kiertscher SM, Cheng Q, et al. Delta 9-tetrahydrocannabinol regulates Th1/Th2 cytokine balance in activated human T cells. *J Neuroimmunol* 2002 ; 133 : 124-31.
- Malfait AM, Gallily R, Sumariwalla PF, et al. The nonpsychoactive cannabis constituent cannabidiol is an oral anti-arthritis therapeutic in murine collagen-induced arthritis. *Proc Natl Acad Sci USA* 2000 ; 97 : 9561-6.
- Buckley NE, McCoy KL, Mezey E, et al. Immunomodulation by cannabinoids is absent in mice deficient for the cannabinoid CB(2) receptor. *Eur J Pharmacol* 2000 ; 396 : 141-9.
- Steffens S, Veillard NR, Arnaud C, et al. Low dose oral cannabinoid therapy reduces progression of atherosclerosis in mice. *Nature* 2005 ; 434 : 782-6.
- Rinaldi-Carmona M, Barth F, Millan J, et al. SR 144528, the first potent and selective antagonist of the CB2 cannabinoid receptor. *J Pharmacol Exp Ther* 1998 ; 284 : 644-50.
- Mittleman MA, Lewis RA, Maclure M, et al. Triggering myocardial infarction by marijuana. *Circulation* 2001 ; 103 : 2805-9.
- Berman JS, Symonds C, Birch R. Efficacy of two cannabis based medicinal extracts for relief of central neuropathic pain from brachial plexus avulsion : results of a randomised controlled trial. *Pain* 2004 ; 112 : 299-306.
- Wade DT, Robson P, House H, et al. A preliminary controlled study to determine whether whole-plant cannabis extracts can improve intractable neurogenic symptoms. *Clin Rehabil* 2003 ; 17 : 21-9.
- Burstein SH, Audette CA, Breuer A, et al. Synthetic nonpsychotropic cannabinoids with potent antiinflammatory, analgesic, and leukocyte antiadhesion activities. *J Med Chem* 1992 ; 35 : 3135-41.
- Burstein SH. Ajulemic acid (CT3) : a potent analog of the acid metabolites of THC. *Curr Pharm Des* 2000 ; 6 : 1339-45.
- Sumariwalla PF, Gallily R, Tchilibon S, et al. A novel synthetic, nonpsychoactive cannabinoid acid (HU-320) with antiinflammatory properties in murine collagen-induced arthritis. *Arthritis Rheum* 2004 ; 50 : 985-98.
- Ibrahim MM, Porreca F, Lai J, et al. CB2 cannabinoid receptor activation produces antinociception by stimulating peripheral release of endogenous opioids. *Proc Natl Acad Sci USA* 2005 ; 102 : 3093-8.
- Ibrahim MM, Deng H, Zvonok A, et al. Activation of CB2 cannabinoid receptors by AM1241 inhibits experimental neuropathic pain : pain inhibition by receptors not present in the CNS. *Proc Natl Acad Sci USA* 2003 ; 100 : 10529-33.
- Malan TP Jr, Ibrahim MM, Lai J, et al. CB2 cannabinoid receptor agonists : pain relief without psychoactive effects ? *Curr Opin Pharmacol* 2003 ; 3 : 62-7.
- Hanus L, Breuer A, Tchilibon S, et al. HU-308 : a specific agonist for CB(2), a peripheral cannabinoid receptor. *Proc Natl Acad Sci USA* 1999 ; 96 : 14228-33.
- Jiang W, Zhang Y, Xiao L, et al. Cannabinoids promote embryonic and adult hippocampus neurogenesis and produce anxiolytic- and antidepressant-like effects. *J Clin Invest* 2006 (sous presse).