

Liste des abréviations et des sigles

Volume 46, Number 2, Fall 2021

URI: <https://id.erudit.org/iderudit/1088445ar>

DOI: <https://doi.org/10.7202/1088445ar>

[See table of contents](#)

Publisher(s)

Revue Santé mentale au Québec

ISSN

0383-6320 (print)

1708-3923 (digital)

[Explore this journal](#)

Cite this document

(2021). Liste des abréviations et des sigles. *Santé mentale au Québec*, 46(2), 10–12. <https://doi.org/10.7202/1088445ar>

LISTE DES ABRÉVIATIONS ET DES SIGLES

ACCESS EO Access Esprits ouverts

ACSP Agence canadienne de la santé publique

AMPQ Association des médecins psychiatres du Québec

AP Activité physique

APAP Antipsychotique atypique à libération prolongée

APS *Attenuated Psychotic Symptoms*

AQPPEP Association québécoise des programmes des premiers épisodes psychotiques

ARMS *At-risk mental state*

ASG Antipsychotiques de seconde génération

BIPS *Brief intermittent psychotic symptoms*

BLIPS *Brief limited intermittent psychotic symptoms*

CAARMS *Comprehensive Assessment of At-Risk Mental States*

CBD Cannabidiol

CBTp *Cognitive-behavioral therapy for psychosis*

Cégep Collège d'enseignement général et professionnel

CFI L'entretien de formulation culturelle

CHR *Clinical high-risk*

CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux

C'JAAD Centre d'évaluation du jeune adulte et adolescent

CLSC Centre local de services communautaires

CM *Case management*

CNESM Centre national d'excellence en santé mentale

COGDIS *Cognitive Disturbances*

CPA Association des psychiatres du Canada

CRD Centre de réadaptation en dépendance

CSMC Commission de la santé mentale du Canada

CSS *Cultural Consultation Service* – Service de consultation culturelle

DAVA Développement des apprentissages à la vie adulte

DPNT Durée de psychose non traitée (traduction de l'acronyme anglais
DUP : *duration of untreated psychosis*)

ECR Essai clinique randomisé

ECS Entraînement cognitif social

EE Émotions exprimées

EEAP Écoute-Empathie-Accord-Partenariat

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EIPN | <i>Early Intervention in Psychosis Network</i> |
| EIS | <i>Early detection and intervention services</i> |
| EM | Entretien motivationnel |
| EMR-P | État mental à risque de psychose |
| EPPIC | <i>Early Psychosis Prevention & Intervention Center</i> |
| ÉQIIP SOL | Équipe d'intervention intensive de proximité |
| ÉRC | Étude randomisée contrôlée |
| FACT | <i>Flexible Assertive Community Treatment</i> |
| FEP | <i>First-episode psychosis</i> |
| FEPP | <i>First-episode psychosis programs</i> |
| GHB | Gamma-hydroxybutyrate |
| GRD | <i>Genetic risk and deterioration syndrome</i> |
| GRIP | Groupement romand intervention précoce |
| HCRU | <i>Health Care Resource Utilization</i> |
| IEPA | Association internationale d'intervention précoce en santé mentale (IEPAf : branche francophone) |
| INESSS | Institut national d'excellence en santé et en services sociaux |
| IP | Intervention précoce |
| IIP | Initiatives d'intervention précoce |
| IPS | <i>Individual Placement and Support</i> |
| IPT | <i>Integrated Psychological Therapy</i> |
| IRSC | Institut de recherche en santé du Canada |
| JADE | Jeunes adultes avec troubles débutants |
| JAP | Jeune adulte psychotique |
| JPEP | Jeunes présentant un premier épisode psychotique |
| JPEPIIR | Jeunes vivant un premier épisode de psychose qui se retrouvent en situation d'itinérance ou d'instabilité résidentielle |
| MCT | <i>Metacognitive Training</i> |
| MSSS | Ministère de la Santé et des Services sociaux |
| NICE | <i>National Institute for Care Excellence</i> |
| NHS | <i>National Health System</i> |
| NIMHE | <i>National Institute for Mental Health in England</i> |
| NNT | Nombre nécessaire pour traiter |
| OCF | Guide de Formulation culturelle |
| OPUS | <i>Modified form of assertive community treatment for psychosis</i> |
| PACE | <i>Personal Assessment and Crisis Evaluation</i> |
| PAF | Pairs aidants famille |
| PANSS | <i>Positive and Negative Syndrome Scale</i> |
| PASM | Plan d'action en santé mentale |

| | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| PEP | Premiers épisodes psychotiques |
| PEPS | Programme émotions positives pour la schizophrénie |
| PLEs | <i>Psychotic-like experiences</i> |
| PPEP | Programmes d'intervention précoce pour premier épisode psychotique |
| PQJ | Projet de qualification des jeunes |
| PSYRATS | <i>Psychotic Symptoms Rating Scale</i> |
| RAISE | <i>Recovery After an Initial Schizophrenia Episode</i> |
| RAMQ | Régie de l'assurance maladie du Québec |
| RC | Remédiation cognitive |
| RGD | Risque génétique avec détérioration |
| RIPAJ | Réseau d'intervention de proximité auprès des jeunes de la rue |
| SAR | Système apprenant rapide |
| SCARF | <i>Schizophrenia Research Foundation</i> |
| SCIT | <i>Social Cognition and Interaction Training</i> |
| SIIP | Suivi intensif en intervention précoce |
| SIM | Suivi intensif dans le milieu |
| SIP | Services d'intervention précoce |
| SIPS | <i>Structured Interview for Prodromal Syndromes</i> |
| SIV | Suivi d'intensité variable |
| SNLG | <i>Sistema Nazionale Linee Guida</i> |
| SPA | Symptômes psychotiques atténués |
| SPIB | Symptômes psychotiques intermittents brefs |
| SUD | <i>Substance use disorders</i> |
| SWEPP | <i>Swiss Early Psychosis Project</i> |
| TA | Thérapie par l'aventure |
| TCC | Thérapie cognitive comportementale (ou cognitivocomportementale) |
| TCCp | Thérapie cognitive comportementale pour la psychose |
| TD AH | Trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité |
| THC | Tétrahydrocannabinol (principale molécule active du cannabis) |
| TIPP | Traitemen et intervention précoce dans les troubles psychotiques |
| TIPS | <i>The Treatment and Intervention in Psychosis</i> |
| TJAH | Trouble lié aux jeux de hasard et d'argent |
| TOC | Trouble obsessionnel compulsif |
| TPL | Trouble de personnalité limite |
| TSA | Trouble du spectre de l'autisme |
| TUS | Trouble de l'usage de substance |
| UHR-P | Ultra-haut risque pour la psychose |